

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Moxalole, pulver til oral opløsning

Macrogol 3350
Natriumchlorid
Natriumhydrogencarbonat
kaliumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Moxalole uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Moxalole

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 2 uger.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Moxaloles virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Moxalole
3. Sådan skal du bruge Moxalole
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Moxalole
6. Yderligere oplysninger

1. MOXALOLES VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Moxalole hjælper dig med at få en behagelig tarmbevægelse også selvom du har haft forstoppelse i meget lang tid.

Moxalole virker også mod meget hård og indeklemmt afføring, som din læge har konstateret, har hobet sig op i ende- og tyktarm.

Macrogol 3350 binder vand og giver derved et øget tarmindehold. Det bevirker at tarmbevægelserne normaliseres. De fysiologiske konsekvenser er en øget bevægelse af blødgjort afføring og tømningen af tarmen lettes. Moxalole indeholder salte for at undgå forstyrrelser i kroppens normale salt- og væskebalance.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MOXALOLE

Tag ikke Moxalole

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer macrogol, natriumchlorid, kaliumchlorid og natriumhydrogencarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har en tilstopning af tarmen, har hul i tarmen eller har en alvorlig betændelse i tarmen som colitis ulcerosa, Morbus Crohn, tarmslyng eller toksisk megacolon (sygelig stor, udvidet og tykvægget tyktarm med ansamling af tarmindehold).

Vær ekstra forsigtig med at tage Moxalole

- hvis du føler dig svag, stakåndet, er meget tørstig med hovedpine eller får opsvulmet ankler skal du stoppe med at tage Moxalole og kontakte din læge med det samme.

Moxalole bør ikke indtages dagligt over længere perioder, medmindre det er aftalt med lægen. Langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer skal du tale med din læge før du anvender Moxalole.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MOXALOLE

Tag altid Moxalole nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis mod forstoppelse er:

1 brev 1-3 gange dagligt. Dosis afhænger af sværhedsgraden af din forstoppelse. Dosis kan nedjusteres efter et par dage. Behandlingsvarigheden er normalt 2 uger. Hvis symptomerne fortsætter efter 2 uger, skal du kontakte din læge.

Bland indholdet af 1 brev med et ½ glas vand (ca. 125 ml). Omrør indtil opløsningen er klar og drik den derefter. Du kan blande opløsningen med frugtjuice eller frugtsirup umiddelbart inden du drikker opløsningen.

Børn (under 12 år): anbefales ikke

Opløsning af hård indeklemmt afføring som din læge har konstateret, har hobet sig op i ende- og tyktarm:

Voksne: Normal dosis er 8 breve dagligt. De 8 breve skal tages inden for en periode på 6 timer hver dag i op til 3 dage. Ved hård indeklemmt afføring er behandlingsvarigheden sædvanligvis højest 3 dage.

Hvis du bruger Moxalole mod hård indeklemmt afføring kan du blande 8 breve med 1 liter vand. Opløsningen skal opbevares i køleskabet.

Børn (under 12 år): anbefales ikke

Patienter med nedsat hjerte/kredsløbsfunktion:

Til behandling af hård indeklemmt afføring bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve i timen.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Regulering af dosis er ikke nødvendig ved behandling af forstoppelse eller hård indeklemmt afføring.

Hvis du har taget for meget Moxalole

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Moxalole, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Hvis du tager for meget Moxalole og du får meget kraftig diaré eller begynder at kaste op, skal du stoppe med at tage Moxalole, indtil det er gået over og start derefter igen med en lavere dosis.

Hvis du har glemt at tage Moxalole

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har nogle spørgsmål om brugen af Moxalole bør du kontakte din læge eller apoteket.

4. BIVIRKNINGER

Moxalole kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Immunsystemet:

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter/hyppighed kan ikke beregnes ud fra nuværende data):

Allergiske reaktioner, som f.eks. reaktioner på huden, snue, allergiske hævelser i ansigtet, pludselige allergiske reaktioner.

Mavetarmkanalen:

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Kvalme, mavepine og mavekramper, luft i maven, diaré og opkastning

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. SÅDAN OPBEVARER DU MOXALOLE

Opbevares ved stuetemperatur. Skal opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. Færdigblandet opløsning kan opbevares tæt tillukket i køleskab (2-8 °C). Kassér resterne af den færdigblandede opløsning, hvis den ikke er brugt indenfor 6 timer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Moxalole efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Moxalole indeholder:

- Aktivt stoffer: Macrogol 3350 (også kendt under navnet polyethylenglycol 3350) 13,125 g; natriumchlorid 350,7 mg; natriumhydrogencarbonat 178,5 mg; kaliumchlorid 46,6 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Acesulfamkalium (E950)(sødestof); citronaroma (smagsstof).

Moxaloles udseende og pakningstørrelse

Hvidt pulver til oral opløsning.

Breve á 13,8 g i kartoner med 8, 10, 20, 30, 50 eller 100 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød
Tlf.: 44 52 88 88
e-mail: info.dk@meda.se

Fremstiller:
Recipharm Höganäs AB
Sportshallsvägen 6
Höganäs
Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Norge, Finland og Sverige: Moxalole
Belgien, Tyskland, Italien, Holland og Storbritanien: Molaxole

Denne indlægsseddel blev senest revideret { MM/ÅÅÅÅ }

08/2008